

~~Recherches~~ recherches sur les hernies
inguinales et crurales compliquées
d'étranglement & par
poussel chirurgien à
coincis-l'abbaye



⁺ pour la
détresse

La hernie ou descente trop souvent compliquée
d'étranglement, ne cesse de faire des victimes,
surtout dans les campagnes où les hommes
occupés à des travaux pénibles, et presque toujours
depourvus des secours nécessaires, ne peuvent éviter
ce dangereux accident, qui est d'ailleurs d'autant plus
à craindre, que les moyens proposés, quoique bons
par eux-mêmes, sont loin d'être avantageux, ne
servent le plus souvent qu'à procurer la peste au
malade; c'est ce que je me propose d'examiner, &
puissent mes recherches être utiles à l'humanité!
puisse l'académie les trouver dignes de son
approbation!

ARC 15d 42. n° 1
il s'agit par de maladie dont la cause soit

moins connue : à quelque chose près elle est toujours
 la même ; cependant il n'en est pas contre la quelle
 on met en usage un plus grand nombre de moyens
 différents. Les uns prescrivent des decoctions de plantes
 emollientes, des embrocations faites avec les graisses
 et les huiles douces, les demi bains ; les autres des
 cataplasmes résolutifs avec les farines de seigle, de
 lin, le miel et le vinaigre, l'onguent mercuriel ;
 quelques uns l'eau végéto-minérale, l'eau froide,
 la neige, la glace, le plâtre, le bol simple
 avec le blanc d'œuf, ou le vinaigre, les balais
 le noir de gale, de cyprès, l'alun, les fleurs
 de camomille, le sel commun ; quelques autres les
 purgatifs, l'inspiration de la fumée du tabac
 par le nez, des petites frictions assez longues
 continuées, les bains, des vessies pleines d'eau ou
 de lait, la vapeur d'une decoction emolliente
 conduite sur la partie malade, par le moyen
 d'un vase portatif, sur lequel on met une petite
 gatte pleine d'eau avec un couvercle en forme
 d'entonnoir, et qu'on peut tourner en tous sens.
 Il y en a qui pour prendre des potions huileuses,

des potions purgatives, pour les rendre les malades par
les pieds: j'en ai vu qui ont fait avaler plusieurs
baies de plomb &c.

Je ne puis, malgré les bornes que je me suis
prescrites, m'empêcher d'en rapporter un autre
pour lequel tous les auteurs, et tous les praticiens
sont unanimement d'accord. c'est la saignée faite
sur que ad deliquium animi. Il est étonnant que
dans un siècle aussi éclairé que celui-ci, un pareil
moyen soit ainsi accrédité. il est vrai que souvent
il est suivi de la rentrée des parties déplacées;
mais d'est-ce par la ~~saignée~~ ou on peut dire que le
remède est pire que le mal. presque toujours à qui
on la fait, éprouvent mille inconvénients, le reste de
leurs jours; et s'il arrive quelque fois qu'ils se rétablissent,
ce n'est qu'avec les plus grandes difficultés. j'ai
ordinairement observé qu'on n'a contenu leurs
descentes, malgré les bandages les mieux faits,
qu'avec une peine infinie. Je n'oublierai jamais
les deux faits suivants que je croi devoir placer



+ avec

deux jeunes gens assez robustes eurent chaumecendres tous
différents une descente avec étranglement. Les
chirurgiens appelés après quelques tentatives —
inutiles pour la réduction par le taxis, mirent
en usage la saignée jusqu'à la syncope, les
parties rentrèrent, on ne manqua pas au fait
d'écarter amicalement, mais qu'arriva-t-il? le premier
mourut hâtivement au bout de quinze ou seize
mois, et le second d'une anasarque au bout
de dix-huit ou vingt; après avoir tous deux
traîné la vie la plus misérable —

ne pourrions-nous pas sans crainte de se tromper
attribuer cette conduite à l'idée d'avantage
qu'on a toujours eue, et qu'on a encore
de l'opération du bubo no celle, ou la de
tout être regardée comme la plus difficile
et la plus dangereuse. cette opinion est
aujourd'hui si généralement reçue, que le
moindre particulier en est pleinement
convaincu. tous les praticiens, et tous les
auteurs ne cessent de le dire et de le dire

ou lire ce qui suit dans un nouvel ouvrage
rempli de choses savantes et très instructives

Pour les moyens que nous avons jusqu'ici proposés
proposés sur ce pour but d'éviter l'opération
mais on est malheureusement que trop souvent
obligé d'avoir recours à ce remède extrême

en il survenant cela veur, qu'après
avoir mis en usage le premier moyen qui
paraît convenir, un chirurgien passe à un
second à un troisième, à un quatrième &c.
pendant ce temps la maladie doit nécessairement
faire des progrès & si l'opération
se fait qu'en tremblant, et le malade qui
s'en aperçoit, et qui d'ailleurs pour les
raisons susdites, seroit autorisé à la
craindre, la refuse avec fermeté.

Je excepte ici seulement les hommes
dont le savoir les a mis au dessus de tout
prejugé, et de toute crainte.



de sorte que d'abord tous deux sans presque s'en
 appercevoir, ils laissent multiplier les accidents qui
 deviennent sans remède, bientôt la mort paraît
 inévitable & l'un l'annonce, et l'autre croit le
 sentir, celui cy ~~se~~ se voit saisi de terreur, et de
 désespoir, ne voit plus d'espérance que
 dans l'opération qu'il s'empresse de demander &
 on ne manque pas d'avertir que le ~~faux~~ en en-
 traînant douloureux ajoute du retard; puis on la
 fait, après mille cérémonies qui sont alors
 nécessaires, et dans peu le malade meurt.
 quelle route plus certaine pourroit-on tenir
 pour la décréditer entièrement?

Le seul moyen de remédier à toutes ces erreurs,
 ce seroit sans doute de détruire l'idée d'avantageuse
 qu'on a de cette opération, qui certainement
 n'est pas aussi difficile qu'on le pense.
 bientôt le chirurgien en hardi cesseroit de
 temporiser, et après avoir mis en usage le
 moyen qui lui paraîtrait le plus convenable,

7.
Je propose sans hésiter : d'un autre côté le
malade qui l'aurait vu fuir d'heure
fuir dans d'autres lieux, bien loin de l'y
opposer ferait le premier à la demander,
pourvu si en prenant les précautions nécessaires
on procurait une cure radicale; on verra dans
l'instans comment je me comporte pour l'obtenir.
Je prie qu'on daigne au préalable prêter
attention à l'usage je fuis en. Je lui dois en
bonne partie en réflexion, et la méthode
que je vais proposer.



Depuis sept ans que j'exerce l'art de guérir;
j'ai été appelé pour vingt-un ou vingt-
deux malades atteints de hernie avec
étranglement. j'en ai guéri douze ou treize
par le taxis, neuf ou dix dans les douze premières
heures, et trois dans les deux premiers jours.
quatre ont péri sans opération; j'en ai

2. j'en
ai opéré
quatre-vingt

opérés cinq dont trois sont morts² et deux sont vivants
et radicalement guéris³. cela pose voici la méthode
que je crois devoir suivre.

Je divise les hernies compliquées d'étranglement,
en deux classes. Dans celles de la première celui-ci
est actif, et passif dans celles de la seconde.
J'appelle étranglement actif celui où les
parties déplacées ne peuvent être réduites
à cause de l'obstacle qui se trouve dans l'anneau,
il peut être de trois manières, ou ces mêmes
parties font effort contre l'anneau, ou le
ligament, ou ceux-ci le compriment, ou il
y a action et réaction de part et d'autre.
Je dis qu'il est passif lorsque la réduction
ne peut avoir lieu à cause du volume des parties
qui ont franchi l'anneau, quoique celui-ci se
trouve contenu sous celui-ci y soit libre. Dans
le premier cas il y a toujours plus ou moins de
tension, de douleur, de chaleur, et de fièvre.
3. J'ai eu l'honneur d'invoyer à l'Académie l'observation que
la première opération m'a fourni. Je vais dans l'instant
donner la seconde

le vomissement et le hoquet en tous les suites 2.
ordinaires. Dans le second au contraire, ces accidents
n'existent pas, si ce n'est ces derniers qui quelque fois
l'accompagnent

Dans l'étanglement actif, après avoir mis le
malade dans la position qu'un chacun connaît, je
tente pendant un instant la réduction par le taxis
avec tout le ménagement possible; si les accidents
sont considérables je fais une saignée de deux ou trois
palettes; pendant ce temps je fais faire une
decotion avec les racines de guimauve, ou la
graine de lin. cela fait, je prends une grosse
éponge que j'applique sur la partie malade,

si il se fait difficile de trouver une application
plus avantageuse que celle là; dans l'instant le malade
se trouve soulagé; rien ne pouvant procurer une
chaleur plus douce plus égale, et une humidité plus exacte
non seulement je m'en sers avec un succès marqué
dans ces maladies dont est en question; j'en ai même
dans toutes celles où les émollients, et les résolutifs conviennent.
je ~~ne puis~~ ^{ne puis} s'en servir



après l'avoir trempée dans une de ces decoctions. je
lote six ou sept heures après, pour tenter de
nouveau la réduction; si elle n'a pas lieu, je
remets mon éponge, pour la relever une seconde
fois à la même distance, et si des nouvelles
tentatives sont inutiles, je propose l'opération.

Je viens de m'en servir avec le plus grand avantage dans
deux engorgements de testicules survenus à la suite
d'une gonorrhée. j'ai été appelé pour le premier
dans le temps où on avoit employé mille moyens. Dejà
on craignoit le schiure. j'ai fait faire une decoction
des racines de guimauve à laquelle j'ai ajouté une
poignée des fleurs de suveau. j'y ai trempé une grosse
éponge que j'ai appliquée sur ^{la partie} ~~le~~ malade; après
l'avoir disposée de façon à envelopper exactement le
testicule, et à couvrir toute l'étendue du cordon, j'en
ai placé une autre sur le malade de la même grosseur
et l'avez afin de recevoir l'eau qui decoulait de la péné-
tration nécessaire pour éviter de changer le drap
trop souvent. Dans peu le malade a été guéri
ce même moyen a été suivi du même succès pour
le second pour lequel j'ai été appelé le lendemain
de l'autre.

pendant ce traitement je fais prendre quelques^{11.}
lavements émollients, qu'on donne par les pieds ou le
pours ne pas déranger le malade.

Dans le triangle veur passif, je tente un peu
plus longtemps la réduction du testis, puis
j'applique la même éponge trempée dans
la même décoction à la quelle j'ajoute une bonne
poignée de fleurs de sureau, de camomille
et de miel blanc. Si de sept en sept heures pendant
deux jours, je fais de nouvelles tentatives; puis je
propose l'opération que je fais à la manière —

Si deux indifferents que c'est l'épiploon ou l'intestin
perçus ensemble; que celui dernier soit
rempli de matières, de vent, d'eau, ou de quel que autre
corps étranger; il ne s'agit alors que de manier la tumeur
avec précaution, afin qu'elle ne rentre pas dans la
première classe, ce qui ne se fait qu'à tarder
moins à faire l'opération. Ayant deux ans que
je réduis une hernie pour le triangle veur et le passif
l'intestin qui la formait contenait au moins soixante
ou quatre vingt noyaux de cerises, je les fis rentrer
dans le sac par les autres en très peu de temps —

+ vésicaux

accoutumée. les parties ventrées, pour obtenir
une cure radicale, je fais dans toute l'étendue
du parois de l'anneau des petites incisions plus
ou moins profondes, plus ou moins rapprochées. et
afin d'éviter les différents ⁺ qui s'y trouvent, je
prends des petites pincettes avec lesquelles je tire
~~à l'air~~ ce que je veux enlever; après quoi
je rapproche aussi exactement qu'il m'est
possible tous les bords de la plaie, que je
peux à se jusqu'à parfaite guérison.

par ce moyen toutes ces parties contractées
ad ~~hébra~~ ~~enferme~~ entières, et le malade
se trouve pour toujours délivré de la descente.

6. je me propose de suivre la même méthode pour
ceux qui nous ont d'étranglement, et qui voudront se
laisser opérer. je suis persuadé que si l'on
suit exactement, on guérira radicalement sans
coudre aucun virgule, pour que tous ceux qui ont de
descente. in uter inutile de vivre qu'en pareil cas, on
laisse l'anneau tout entier -

7. je suis bien sûr que si l'on suit cette méthode
il n'arrivera souvent de faire l'opération
dans un tems où j'aurais pu rien passer; mais
l'avantage que je dois en retirer compensé avec
les inconvénients que me peuvent par d'hepiter...

132

22. tout cela suppose qu'on en appelle de bonne
heure, ce qui infailliblement arriverait
toujours, si la crainte qu'inspire ~~la maladie~~
l'opération à tous les malades, ne les engagerait
à retarder autant qu'ils peuvent, pour tout
tout en change, et il arrive trop souvent
que malgré qu'on fasse l'opération toute de
suite, on trouve ordinairement les parties
déplacées dans un très-mauvais état, le
pire de tout est la gangrène, si c'est
l'intestin qui en est attaqué, la méthode
de Mr vitsch me paraît la meilleure;
si c'est l'épiploon, on nous conseille
d'emporter ce qui n'est pas sain autant
que faire le possible; après avoir fait
une ligature un peu au dessus. je n'ai pas
assez souvent vu cette complication
pour oser dire ce que je pense du
traitement qui lui convient. je m'en



en fait instant; non seulement on trouve alors
l'opération beaucoup moins difficile; mais même,
on lui dérivant d'obtenir par ce moyen une cure radicale.

tiendrai aujourd'hui à requiescences l'observation
suivante

observation Sur une hernie
compliquée d'étranglement
d'adhérence &c.

J'ai été appelé dans le printemps passé
à une lieue de ma résidence pour un laboureur
agé de cinquante ans, qui depuis trois ⁺ ne
cessait de vomir, à la suite d'une hernie
^{7 jours} compliquée d'étranglement, qui alors me parut
passif après plusieurs tentatives pour la
réduction par le taxis, je proposai l'opération.
Le malade me répondit que mourir pour mourir,
il valait mieux le laisser tranquille & tous ses
parents me répondirent de même. Le lendemain
la fièvre survint, ce qui m'engagea à lui faire
une saignée. Le onzième jour, malgré mille
moyens qu'on mit en usage, la mort parut

prochaine à tout le monde; alors bien loin de
 rejeter l'opération, le malade la demanda
 lui-même. je ne voulus la faire qu'en présence
 de quelqu'un qui en cas de besoin pût m'aider,
 on envoya à Chateaufortier chez le propriétaire
 de la ferme, qui fit venir son médecin. la
 tumeur mise à découvert, nous la trouvâmes
 adhérente, et formée par l'épiploon et
 l'intestin, le premier étoit d'une grosseur
 considérable, et comme calleux, l'engorgement
 se continuait bien avant dans le bas ventre;
 on y apercevait plusieurs points suppurants,
 et plusieurs autres plus ou moins violets, bruns
 et noirs. nous en aperçûmes aussi quelques uns
 sur l'intestin, mais plus séparés et moins étendus.
 après que j'eus mis l'anneau et détruit
 l'adhérence, le parti qui me parut le plus
 avantageux, fut de remettre le tout dans le
 bas ventre, et d'abandonner à la nature



16.

le soin de séparer par la suppuration ce qui
 n'était pas sain, et de dégorger ce qui l'était. Je
 prescrivis pour toute nourriture des bouillons
 de poulet, et des crèmes de ris très-légères. Sa
 boisson était de l'eau dans laquelle je
 faisais mettre quelque cuillerée de sirop de
 guaiac. Bientôt la suppuration devint
 abondante. pendant quel que tems je trouvais
 dans la charpie des petites parties de l'épiploon
 le sixième jour de l'opération les aliments
 sortirent par la playe, ce qui annonça la
 chute des petits points violets que j'avais
 aperçus sur l'intestin. Je fis observer plus
 exactement que jamais la diète la plus
 vigoureuse, espérant qu'en entretenant les
 intestins vuidés, j'obtiendrais plus aisément
 la réunion des bords des leurs petites playes,
 ou leur adhérence avec les parties voisines.
 Je fis donner tous les jours un ou deux lavemens.
 Dans peu la suppuration fut très-louable

les excréments sortirent par l'anus, et au bout
de deux mois le malade fut radicalement
guéri. il est délivré de la descente à la
quelle il était sujet depuis plusieurs
années.

je n'ai rien dit des incisions que je
conseille de faire, on s'opposoit qu'en
détruisant l'adhérence, elles se font trouvées
toutes faites, ce qui a produit le même
effet.

Boumel

1780



18.

1780

1781